

Flatworm-X

ダウンロード版 取扱説明書



フラットワーム エックス

フラットワームエックスをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもすぐに読むことができる場所に大切に保管してください。

サンゴに付着しているフラットワーム（ヒラムシ）を処理します。

水槽内で増殖する見た目も悪いフラットワームを効果的に処理することが可能です。


危険 含有物：Tetramisole hydrochloride

注意

- ・使用方法を誤ると生体や水槽に重大な悪影響を及ぼします。説明書を良く読み、理解してからご使用ください。
- ・皮膚や目へのダメージを与える恐れがあります。使用の際は防護手袋や防護服、防護眼鏡、防護マスクをご着用ください。
- ・目に入った場合は、数分間水で慎重に洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。
飲み込んだ場合は、口をゆすいでください。無理に吐こうとせず、直ちに医師の診察を受けてください。
原液が皮膚（または髪）・衣類に付着した場合は、付着した服を全て脱ぎ、すぐに皮膚（または髪）を大量の水で洗い流し、石鹸で洗ってください。衣類はよく洗濯してからご使用ください。
- ・医師に相談する際は、製品の容器をお持ちください。
- ・本製品は水槽内に直接添加できません。
- ・本製品の使用中は常に容器内のサンゴを観察し、異常があった場合は直ぐに使用を中止し、サンゴを新しい海水でゆすいでから水槽に戻してください。
- ・過剰添加は生体に重大な影響を与えますので、添加量を厳守してください。
- ・弱ったサンゴにはご使用になれません。弱ったサンゴを元気にする効果はありません。
- ・お子様の手の届かない冷暗所に厳重に保管してください。
- ・本製品の使用による生体の死亡等には一切の保証は行いません。予めご了承ください。

●使用方法

- ① 飼育水槽とは別の2つの容器AとBを用意します。
- ② 処理を行うサンゴのサイズに応じて、温度や濃度に配慮した新しい海水を用意します。
- ③ 容器Aに、②で用意した海水1Lに対して本製品1滴の割合で添加し、よくかき混ぜてください。
- ④ 容器Bには、容器Aと同じ量の新しい海水を入れます。
- ⑤ 容器Aにサンゴを入れ、5分～10分待ちます。
この時、手で軽くゆすぐか、小さなポンプを使用して水溶液を攪拌するとより効果的です。
- ⑥ 容器Aからサンゴを取り出し、容器Bに移してしっかりとゆすいでから、飼育水槽にサンゴに戻してください。
- ⑦ ご使用後はすぐに容器の水を捨て、手を石鹸で洗ってください。



- ※ 一度にすべてのフラットワーム処理ができなかった場合、連続で使用せず、翌日にもう一度処理を行ってください。
- ※ 使用した水溶液は死んだフラットワームが毒素を放出する可能性があるため、再使用はしないでください。
- ※ 他の水溶液と併用しないでください。

輸入・発売元／株式会社エムエムシー企画

〒174-0063 東京都板橋区前野町 6-29-4

ホームページ：http://aqua.mmccorp.jp お問い合わせ E-mail：info@mmcplanning.com